



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.



Philosophical Transactions

Please note: Due to an error in the print volume, the page numbering in this article may contain either page numbering skips, or page numbering repetitions, or both. However, the article content is presented in its entirety and in correct reading order.

Please click on "Next Page" (at the top of the screen) to begin viewing the article.

IV. *Dissectio Puerpera, Communicata a Petro Silvestre, M. D Soc. Reg. Socio.*

M. Duchesne quadraginta Circiter annos nata, plethorica, & quæ sæpius etiam gravida menstruum patiebatur fluxum, cæterum optimè valens & obesa, jamque Vigessimum prægnans, urgente legitimo partus tempore, Circa quartam pomeridianam die Novembris 12. Anno 1697. Horrenda Uteri Hæmorrhagia Corripitur Vocatus post horam nonam *Jacobus Arnaudin* Obstetriciæ non minus Artis quam Chirurgicæ peritus, & de Gravissimo illo Sanguinis profluvio certior factus, nullo prorsus remedio urgenti adeo sanguinis jacturæ Occurri posse putabat, nisi quamprimum sarcina sua Uterus levaretur. Sed, ut plerumque fit, adstantes nihil temere moliendum, & rem totam naturæ permittendam clamabant. Exinde Viribus prorsus exhaustis, Circa Mediam noctem iterum accersitur prædictus *Arnaudin*, qui nulla interposita mora operi se accingens intra dimidium horæ *Puellam* mortuam extrahit, secundinis integris & illæsis absque labore subsequenter. Uteri tamen Hæmorrhagia usque perseveravit; hancque summa jactatio, Pulsus debilitas, Lipothymiaæ frequentes, sudor frigidus, motus Convulsivi subsequebantur. Tandem Cæra Sextam horam matutinam vitam cum morte Commutavit.

Die sequenti Cadaver secumimus: Aperto Abdomine, & remotis tum pingui admodum Omento, tum intestinis tenuibus, uterus in Conspectum venit, instar majoris Cucurbitulæ, Crassus ac satis distentus. In dextro ligamento lato Ecchymosis ingens erat, quæ ex latere uteri, illic ubi Vasa *SpermatICA* & *Hypogastrica* per Anastomosis uniantur, descendebat, & in inferiori parte Colli Matricis, ubi sci-

licet intestino recto incumbit, maxime conspicua erat. Ut autem omnia facilius examini subjicerentur, Uterum cum annexis resectum, & e pelvi extractum tabulæ imposuimus. *Vagina* admodum laxa erat: Orificium internum adeo Apertum, ut dimidium pugnum facile excepisset. Utero secundum longitudinem secto, hæc Conspiciebantur: fundum grumis aliquot sanguinis scatens, cæterum integrum & sanum: in hoc autem *Placenta Uterina* adhæsiō nobis facile Conspicua; quo loco etiam interna Uteri substantia inæqualis, Crassior, & quasi Carnosior Observabatur. In inferiori parte Colli uteri Causa mortis Apparuit, Laceratio nempe duorum digitorum Capax, quæ etiam extrinsecus, ubi scilicet ea Ecchymosis, Conspici poterat. An a Causa aliqua externa uterus disruptus fuerit, an potius a vehementiori Calcitratiōe Infantis, ut aliquando accidisse memorant Observationum Medicarum Scriptores, ignoro: Sed exinde aperta fuisse majora Vasa, quæ enormem illam sanguinis Copiam effudere, Certum est. Diductis tunicis, & tubulo inter duplicaturam immisso, flatus ex plurimis angustis foraminibus, cum ex ea fundi parte cui *Placenta* jungebatur, tum præcipue ex lacera Colli parte, undiquè erumpebat:

In dextro *Ovario* Vestigium seu Cicatriculam manifeste Notavi, ex qu *Ovulum* deciduum, a tubæ Cavitate exceptum, ejusdemque Motu Peristaltico ad Uterum delatum fuisse mihi dubium non erat. *Ovarium* sinistrum flaccidum & quasi exuccum: *Tuba* ex utroque latere Aperta, ligamenta rotunda Valida; reliqua omnia Sana Observabantur.

Licet Uterus subito post Puerperium Contrahatur & Coarctetur, adeo ut, quod modo Dixi, in hac fœmina sex Circiter horis a partu Mortua, Cucurbitulæ Majoris Capacitatem vix Superaret; Attamen illum instar Marsupii, vel sacci digitis extendere facile potui. Et revera fibras Carneas in graviditate sensim adeo elongatas, & tanto intervallo a se mutuo discretas, non nisi post aliquod
tem.

tempus pristinum tonum & robur acquirere posse, quis non videt ?

Obiter hic notabo ferme de nihilo esse hanc quæstionem, quæ Vulgo ab Anatomicis agitari solet, an scilicet *Uteri tunicæ in Prægnantibus multo Crassiores sint, quam in statu Naturali* ? Fateor equidem substantiam Uteri in non prægnantibus firmiorem, Compactiorem, & revera Crassiolem esse, cum fibræ Carneæ tunc breves sint & summe Contractæ : in Gravidis autem, quod hic Autopsia me docuit, uterum esse multo laxiorem ob fibras extensas, & majori intervallo a se discretas. Præterea cum vasa Sanguifera, quorum flexuosæ, & quasi Serpentinæ ramificationes, pampinos vitium in statu Naturali imitantes, Uteri fundum & latera perreptant, in gravidis cum utero extensæ sint, & a se invicem divisa ; hinc fit ut tunicæ graciliores, & multo minus densæ appareant. Verum, quod Ventrículo, vesicæ Urinariæ, aliisque partibus Membranosis Accidit, quæ dum extenduntur multo Graciliores evadunt ; Cur eadem prorsus ratione illud ipsum utero non contingat, causa evidens est ; si quidem qua proportionem extenduntur illius tunicæ, eadem Augentur, ac pro *fetus* nutritione & accretione dilatantur Vasa omnis Generis in illas confertissime distributa. Adde quod interna Uteri substantia quamplurimis propriis ductibus pervia tunc Crassior evadit, & præcipue in fundo ubi *Placenta* adnascitur, densior est ; quod etiam in Animalibus *Cotyledoniferis* seu *Glanduliferis* Manifeste deprehenditur. Occasionem autem errandi hinc Natam credo, quod cum nonnulli paulo post Puerperium Cadavera secuerint, quo tempore Uterus statim Coactatur, Vasaque adhuc dum varicosa sunt & sanguine distenta, facile hoc Anatomicis imponere potuit, ut in Gravidis uteri tunicas duplo quam in Naturali Constitutione Crassiores censuerint : Sed hæc non adeo magni sunt momenti, ut in diversas ire sententias necesse sit.

Cæterum Observatione digna est singularis illa, quam supra indigitavi, Vasorum Sanguiferorum in Uterum dif-
feminatio. Arteriæ nempe ac Venæ *Spermaticæ* ac *Hypo-
gastricæ* in fundo & ad latera Matricis Capreolorum Viti-
um instar, eleganter intortæ sunt : Hinc non Modo ad
prægnantis Uteri modum extendi possunt, sed & postre-
mis gestationis Mensibus, dum ad rectam lineam propius
accedunt, facilius Sanguinis per illas transitus & distributio
succedit. Quantum autem illud conferat ad eam succi
Nutritii quantitatem suppeditandam, quæ *Fœti* jam gran-
diori sufficiat, pluribus hic explicare superfluum esset.
